


# 心導管檢查 術後護理

## 檢查後轉回病房注意事項

### 1. 由鼠蹊部檢查：

- 檢查部位加壓 6 小時，檢查患肢勿彎曲、需平躺 6 小時，6 小時後會移除紗捲、加壓板、導尿管(需醫師評估是否可移除)。
- 平躺注意事項：檢查患肢勿彎曲；健側下肢可於床上活動。




- 檢查患肢勿彎曲；健側下肢可於床上活動。
- 禁止下床：於床上使用便盆。
- 腰背酸痛時，予按摩、床上平行移動，但不可側躺或翻身。



- 平躺六小時後下床，先坐於床沿，無不適再下床，務必有家屬陪伴。



2. 由手部檢查：術後可下床，勿彎曲患肢，導管移除後，需紗捲及膠布加壓貼住約 4 小時，勿彎曲前臂或手腕。
3. 紗布滲血範圍擴大時，請告知醫護人員。
4. 加壓時檢查部位腳趾或手指，有麻、刺痛、冰冷、顏色蒼白或變紫色時，立即告知醫護人員。



5. 檢查後回到病房，觀察 30 分、1 小時、2 小時是否有心悸、胸悶、胸痛、嘔吐、傷口疼痛，護理人員會測量血壓、心跳、檢查傷口出血情形。



6. 可於床上進食，若無禁忌大量喝水以利顯影劑排出。



## 術後傷口護理

1. 傷口會以紗捲加壓 4-6 小時(時間因個人體質、用藥不同，而有差異)，請勿自行拆除。
2. 若感覺任何身體不適、手、腳末端麻木、傷口滲血，請立即通知醫護人員。
3. 檢查次日傷口換藥。



資料來源：圖片由網路截取