

檢驗名稱	Anti-HBc Ab	中文名稱	B 型肝炎核心抗體檢查
檢驗代碼	hbcg	健保編號(點數)	14051C (250)
檢體種類	血清/血漿	檢驗方法	電子化學冷光免疫法
採集容器	含 Gel 紅頭管/Heparin 綠頭管	操作時間	星期一、三、五
採檢體量	3mL	報告時間	3 個工作天
送檢時間	24 小時收件	操作單位	檢驗科
採檢注意	無		
檢體保存	室溫(20-25℃)可保存7天；2-8℃可保存14天		
生物參考區間/ 臨床決策值	生物參考區間 Nonreactive(COI $\geq$ 1.0)		
臨床意義	在 B 肝病毒感染期間,一般都會形成 HBcAg 的抗體,而且通常會終生存在。 在一感染 B 型肝炎, Anti-HBc 就會隨即出現,並在 HBsAg 出現不久之後就可以在血清中偵測到。Anti-HBc 抗體持續存在於 B 肝感染痊癒的病人以及帶原者身上,因此 Anti-HBc 抗體為目前或過去曾感染 B 型肝炎的指標。在極少數的案例中,感染 B 肝也可能在免疫上沒有出現可測得的 anti-HBc(通常是發生在免疫抑制的病人身上)。因為感染 B 肝後 anti-HBc 會長期地存在體內,所以篩檢 anti-HBc 可以為特定族群中 B 肝的傳播情況提供最好的資訊。測定 anti-HBc 並合併其它 B 肝檢測可用來診斷及監控的 B 肝感染。在其它 B 肝標記(marker)沒有出現的情況下(HBsAg 為陰性的病人), anti-HBc 可能是感染 B 肝唯一指標。		
備註			

修訂日期:2025.2.24